



Applikationsstrategie Insektizide 2023

Erdflöhe



Bek.richtwert

Erdfloh	20	% der Blattfläche vernichtet oder	bis 2-Blatt-Stadium
	40	% geschädigte Pflanzen	

Bekämpfung

Pyrethroid¹

Blattläuse

(ohne Erdflöhe)



Bek.richtwert

Grüne Pfirsichblattlaus	10	% befallene Pflanzen	bis Reihenschluss
Schwarze Bohnenlaus	30 *	% befallene Pflanzen	vor Reihenschluss
	50	% befallene Pflanzen	nach Reihenschluss

Bekämpfung

Mospilan & Tepeki

maximal 1 Anwendung / Saison

Carnadine

maximal 2 Anwendungen / Saison

1. BehandlungPirimor G
300 g/ha

(Nützlingsschonend)

2. BehandlungMospilan SG 250 g/ha
oder
Tepeki 140 g/ha
oder
Carnadine 0,25 l/ha**3. Behandlung**Tepeki 140 g/ha
oder
Carnadine 0,25 l/ha
oder
Mospilan SG 250 g/haErdflöhe² + Blattläuse²

Carnadine 0,25 l/ha oder Mospilan SG 250 g/ha

Bek.richtwert = Bekämpfungsrichtwert

* = Bei deutlicher Koloniebildung bis BBCH 14 evtl. Behandlung bereits bei geringerer Befallshäufigkeit erforderlich

1 Nach Möglichkeit im Zuckerrübenanbau zugelassenen Pyrethroide zusammen mit NAK ausbringen**2** Bei Mischinfektion von Erdfloh und Blattläusen die Mittel Carnadine (Max. 2 Anwendungen) oder Mospilan SG (1 Anwendung) verwenden