



Juni 2019

ACHTUNG: Blattläuse in Zuckerrüben kontrollieren

An einzelnen Blattlaus-Monitoring-Standorten sind die Schadschwellen zur Bekämpfung von Blattläusen erreicht. Meist handelt es sich um die schwarze Bohnenlaus, vereinzelt ist auch die Grüne Pfirsichblattlaus zu finden.

Bitte kontrollieren Sie Ihre Bestände auf Besatz von Blattläusen bzw. deren Kolonien. Diese finden Sie vor allem an den Blattunterseiten junger Blätter. Bis zum Reihenschluss liegt die Schadschwelle bei 10 % befallener Pflanzen. Später dann bei 50 %.

<u>Mittel:</u>	Mospilan SG (Acetamiprid)	250 g/ha
	oder	
	Teppeki (Flonicamid)	140 g/ha
	oder	
	Pirimor (Pirimicarb) (Aufbrauchsfrist 31.10.2019)	300 g/ha
	oder	
	Bulldock (beta-Cyfluthrin)	0,3 l/ha

Wasser: Mindestens 300 l/ha, grobtropfig spritzen

Anwendung: möglichst frühmorgens oder spätabends

alle Mittel sind mit Blattdünger (Bor) mischbar, vorausgesetzt es wird
Markenware verwendet!

Bei einer notwendigen Zweitbehandlung bitte an einen Wirkstoffwechsel denken, um Resistenzbildung zu vermeiden!

Also: Achten Sie auf weitere Warnmeldungen!